



Bruksanvisning AntiFungal og Improver

Selv om sopp som *Candida Albican* og sykdomsfremkallende bakterier som f.eks *e.coli* normalt er tilstede som en del av den naturlige mikroflora hos duer, kan stress situasjoner medføre uønsket oppblomstring av disse. Da er ofte resultatet duer som er langt i fra form og med nedsatt immunforsvar og styrke. Slike duer vil ikke kunne prestere maksimalt verken i avl eller i flyvekonkurranser.

Kombinasjonen **AntiFungal** og **Improver** hemmer oppblomstring av sykdomsfremkallende sopp og bakterier, samtidig som blandingen stimulerer de naturlige melkesyrebakteriene i krås og mage.

Gies til så vel praktduer som til brevdUER, til voksne duer og ungdUER. Meget effektiv under stressbetingelser som avl, flyving, avvenning og under felleperioden. Effekten er *sterkere, sunnere og mer vitale* duer som orker mer innen såvel avl som på flyvninger!

Kombinasjonen **Improver** og AntiFungal er også perfekt å gi etter en antibiotikakur. Gi da behandlingsdosering (se under). Da vil den bidra til at duene raskt får tilbake sin naturlige mikroflora i krås, mage og tarm. Derved restitueres den meget raskere.

FOREBYGGENDE

1 måleskje (tilsvarer 2.5 gram, dvs ca. en teskje) av hvert produkt (måleskje vedlagt i boksene) gis til 4 liter vann 2-3 dager i uken. For at **AntiFungal** skal virke, så må det gis sammen med **Improver**. Årsaken til dette er at den biologiske aktive komponenten i AntiFungal KUN virker i surt drikkevann med pH < 5. En måleskje Improver vil gi pga kjemisk buffereffekt gi pH på ca. 4 når den tilsettes alt fra 2- 4 liter vann.

BEHANDLING

Sopp behandles effektiv ved å gi 1 måleskje Improver og 1 måleskje AntiFungal til drikkevannet i 2 uker. Dosering bør da være 1 måleskje av **Improver** og en måleskje av **AntiFungal** til 2 liter vann. Risikoen for å få en oppblomstring av sopp er stor etter en antibiotika kur, eller når duene utsettes for stress og det samtidig er høy luftfuktighet (i perioder med regn, ved varmt vær eller ved for mange duer på slaget).

NOEN EKSEMPLER PÅ BRUK

Ved andre preparater i drikkevannet

Improver og AntiFungal kan blandes i drikkevannet med "vanlige" ikke-medisinske preparater som vitaminer, elektrolyter, ølgjær, probiotics (melkesyrebakterier). Kombinasjoner med gul knopp mediosin som Ronidazol og Gambakokzid synes også å gå veldig bra. Vi anbefaler dog som grunnregel IKKE å blande Improver og AntiFungal med medisiner. Etter antibiotikakurer anbefaler vi en påfølgende ukes behandlingsdosering med AntiFungal og Improver, gjerne sammen med Probiotics og B-vitaminer.

Ved parring av avlsduer og flyveduer.



Dette er en periode som vanligvis er forbundet med mye stress for duene, og vi ser ofte stress symptomer som mørk grønn flytende avføring. Gi Improver og AntiFungal den første uken av sammenparringen, og da gjerne i behandlingsdosering (1 teskje eller 1 måleskje av hvert produkt i 2 liter vann). Deretter kan duen få forebyggende dosering 2-3 dager i uken gjennom hele avlssesongen. Alternativt kan duene gjennom hele avlssesongen få tilskudd av halv forebyggende dosering hver dag. Dvs ½ måleskje Improver og en ½ måleskje AntiFungal i 4-5 liter drikkevann daglig. Duene vil da få ekstra krefter og vitalitet, og ungene vil få en sunnere start på livet. De aktive komponenter i Improver og AntiFungal er godkjent som vekstfremmere for smågris innen landbruket.

Avvenning av dueungene

Fravenning av ungene er også en stressperiode. Gi Improver og AntiFungal daglig den første uken av fravenningen, og da gjerne i behandlingsdosering (1 teskje eller 1 måleskje av hvert produkt i 2 liter vann). Deretter kan dueungerne få forebyggende dosering 2-3 dager i uken gjennom hele sommersesongen. Når konkurransene og den hårde treningen setter inn, bør tilskuddet gis som for de voksne duene (forebyggende dosering 2 dagene etter hjemkomst, lørdag til mandag). Ved en fuktig sommer (eller varm sommer med mange ungduer på slaget), kan det med fordel gis en behandlingskur på 2 uker før konkurransesesongen starter.

Flyveduerne

Kan med fordel få en behandling etter avlssæsonen, men inden flyvesæsonen tar til. Gi behandlingsdosering i to uker. Siden behandlingen ikke gir noen uheldige bivirkninger, så kan godt denne behandlingen gis kort tid før sesong start (og gjerne etter en antibiotikakur dersom en slik har vært gitt til duene).

I flyvesesongen kan forebyggende dosering gis hjemkomst dag (f.eks lørdag) og to påfølgende dager (søndag og mandag frem til skifte av vann). Kombineres gjerne med gul knopp medisin, probiotics, elektrolytter, druesukker og det som vanlig vis brukes. AntiFungal og Improver i kombinasjon gjør at duene raskere restituerer seg gjennom at den naturligere mikroflora gjenvinnes raskere, og at duen derigjennom raskere blir "fit for fight" til neste helgs konkurranse.

Ta kontakt med oss i Pigeon Vitality om du har spørsmål.
mail@pigeonvitality.com eller tlf. 90 03 42 59.